



# TDA AutoTest

## Resultados de la evaluación

- a. Probabilidad de diagnóstico positivo de TDA/H.
- b. Áreas de funcionamiento afectadas.
- c. Perfil de disfunción ejecutiva.
- d. Otros problemas presentes en salud mental.



## Síntomas Cardinales

Desatención: 80

Hiperactividad: 90

Impulsividad: 90

**TDAH Actual: 90**

Valor de referencia:

Área afectada = 90 o mayor

Valor de referencia:

Diagnóstico compatible con TDAH = 90 o mayor



## Rendimiento / Funcionamiento

Familia = 25 %.

Trabajo = 50 %

Educación = 100%.

Habilidades de vida = 75 %.

Autopercepción = 50 %.

Vida Social = 50 %.

Conductas de Riesgo = 30 %.

### Valores de referencia:

Hasta 25 % = Buen funcionamiento

Del 25 % al 50 % = Funcionamiento regular.

Del 50 % 100 % = Funcionamiento deficitario.



## Funciones Ejecutivas

Manejo del tiempo = 80.

Organización = 80.

Inhibición = 100.

Motivación = 75.

Regulación Emocional = 50.

**Disfunción Ejecutiva TOTAL = 50.**

**Valor de referencia:**

Función Ejecutiva Afectada = 90 o mayor.

**Valor de referencia:**

Disfunción Ejecutiva compatible con TDAH = 90 o mayor.



## Apartado profesional

### Comorbilidades

Referencia: a mayor porcentaje mayor probabilidad.

Trastorno del Espectro Autista = 25 %.

Pánico / Agorafobia = 50 %

Trastorno de Ansiedad Social = 100%.

Trastorno Obsesivo Compulsivo = 75 %.

Trastorno de ansiedad generalizada = 50 %.

Trastornos del sueño = 50 %.

## ¿Qué es el TDA/H?

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA/H) es un **trastorno neurobiológico** común afectando a entre el cinco y el ocho por ciento de niños en edad escolar, con síntomas que persisten en la adultez en hasta un sesenta por ciento de los casos (es decir, aproximadamente cuatro por ciento de adultos). Se caracteriza por niveles de inatención, impulsividad e hiperactividad inapropiados con respecto al nivel de desarrollo.

Los síntomas normalmente comienzan en la primera infancia y continúan hasta la edad adulta. En algunos casos, el TDAH no se diagnostica hasta que la persona es adulta, ya que los síntomas pueden no ser tan claros como los síntomas del TDAH en los niños. En los adultos, la hiperactividad puede disminuir, pero la lucha contra la impulsividad, la inquietud y la dificultad para prestar atención pueden continuar.

Aunque las personas con este trastorno pueden llevar vidas muy exitosas, si el trastorno no se identifica y se trata adecuadamente, el TDA/H puede tener consecuencias graves, como **fracaso escolar, estrés y conflictos familiares, depresión, problemas interpersonales, abuso de sustancias, delincuencia, riesgo de accidentes y fracaso laboral.**

Además, el TDA/H frecuentemente ocurre **en conjunto con otros trastornos**, como depresión, ansiedad o trastornos del aprendizaje. Cuando existen trastornos comórbidos, los problemas académicos y conductuales, además de los emocionales, podrían ser más complejos.

Recientemente las investigaciones han descubierto que el TDA/H está asociado con déficits en las **funciones ejecutivas**. Dichas funciones tienen un papel clave en el rendimiento e impactan el éxito académico y laboral. Son las encargadas de organizar y regular el comportamiento, permitiendo que los individuos aprecien las consecuencias a largo plazo de sus acciones.



## ¿En qué consiste el tratamiento?

1. Entrenamiento cognitivo conductual.
2. Tratamiento médico.
3. Modificaciones socio ambientales.



## Pasos seguir

¿Te gustaría tener una devolución personalizada o empezar un tratamiento específico?

- Enviar un correo electrónico a: [info@inecap.org](mailto:info@inecap.org)
- Completar el formulario de contacto en [www.inecap.org](http://www.inecap.org)
- Escribir vía WhatsApp a +5491127940095